



بسمه تعالی  
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان  
مرکز آموزشی درمانی رازی



کد مدرک : RAZI- MPS – TA – 08/05

شماره:

تاریخ: 1403.3.10

پیوست: دارد  ندارد

### جدول کد گذاری و تعیین معیار بیمار پرخطر

| معیار   |   | بیماران در معرض خطر                      | علامت اختصاری |
|---|---|--|---------------|
| 23-19 بدون خطر  | معیار برادن                                     | زخم فشاری<br>BED SORE RISK               | BS            |
| 15-18 خطر متوسط   |   |  |               |
| 13-14 پر خطر  |   |  |               |
| 10-12 خیلی پرخطر  |   |  |               |
| 45 و بیشتر ریسک بالا  | مورس مقیاس                                      | در معرض سقوط<br>falling risk             | FR            |
| 25-44 ریسک متوسط  |   |  |               |
| 0-24 ریسک کم  |   |  |               |
| DVT(75%) به ابتلا به نسبت بالا خطر 3 از بیشتر امتیاز  | معیار ولز برای تشخیص ترومبوز وریدهای عمقی (DVT) | ترومبوآمبولیسم<br>Venous thromboembolism | V.T.E         |
| امتیاز بین 2-1 خطر متوسط (17%)  |   |  |               |
| در امتیاز کمتر از 1 خطر پایین (3%)  |   |  |               |
| خطر متوسط و امتیاز بین 2-6 امتیاز و پایین خطر کمتر از 2 امتیاز بالاتر از 6 خطر بالا می باشد | برای ولز معیار آمبولی تشخیص ریه                 |  |               |
| زیاد بسیار ریسک خودکشی ، بیشتر 12 یا امتیاز   | NGASR   | ریسک خودکشی<br>SUICIDE RISK              | SR            |
| زیاد خودکشی ریسک ، 11 تا 9 بین امتیاز   |   |  |               |
| متوسط خودکشی ریسک ، 8 تا 6 امتیاز   |   |  |               |
| کم خودکشی ریسک ، کمتر یا 2 امتیاز   |   |  |               |
| وزن برحسب کیلوگرم تقسیم بر مجذور قد برحسب متر   | BMI 20 زیر                                      | سوء تغذیه<br>MALNUTRITION                | MN            |
|   | در بیمار کمتر از 19 سال، از معیارزد اسکور       |  |               |
| ذکر سابقه تشنج یا احتمال تشنج در بیمار  |   | تشنج<br>SEIZURE                          | S.Z           |